

Thüringer Qualitäts- Saatmischungen für den Ackerfutterbau (mit Eignung für KULAP und ÖVF) 2020/21

EIGNUNG der Qualitäts-Saatmischungen

einsömrriger, mehrschnittiger Ackerfutterbau

Saattermin:	März/April
vorwiegende	A2 Silage, Heu
Nutzungs-	1.1. Silage, Heu
eignung:	1.2. Frischfutter

überjähriger, mehrschnittiger Ackerfutterbau

Saattermin:	Ende Juli bis Anfang September
vorwiegende	A1 Silage, Heu
Nutzungs-	2.1. Silage, Heu
eignung:	2.2. Silage, Heu
	2.3. Silage
	2.4. Frischfutter

zwei- und mehrjähriger Ackerfutterbau

Saattermin:	März/April
vorwiegende	3.1. Frischfutter, Silage, Heu
Nutzungs-	3.2. Silage, Heu
eignung:	3.3. Frischfutter
	3.4. Frischfutter, Silage, Heu
	3.5. Frischfutter
	3.6. Silage, Heu
	3.7. Silage, Heu
	3.8. Silage, Heu
	3.9. Silage, Frischfutter, Heu
	3.10. Silage, Frischfutter, Heu

Die Qualitäts-Saatmischungen für den Ackerfutterbau berücksichtigen langjährige praktische Erfahrungen sowie Versuchsergebnisse und entsprechen den Standortbedingungen im Freistaat Thüringen.

ANBAUGEBIETE FÜR DEN MEHRSCHNITTIGEN ACKERFUTTERBAU IN THÜRINGEN

6 sommertrockene Lagen

< 350 m über NN
< 600 mm Jahresniederschlag
> 8 °C Jahresdurchschnittstemperatur der Luft

7 günstige Übergangslagen

350 - 600 m über NN
600 - 800 mm Jahresniederschlag
6 - 8 °C Jahresdurchschnittstemperatur der Luft

SORTENEMPFEHLUNG


Dt. Weidelgras früh	AG	Bastardweidelgras	AG
Arvicola (t)	6,7	Enduro (t)	6,7
Giant (t)	6,7	Ibex (t)	6,7
Mirtello (t)	6,7	Leonis (t)	6,7
Panino	6,7	Melcombi (t)	6,7
Salmo (t)	6,7	Pirol	6,7
Dt. Weidelgras mittel		Rusa (t)	6,7
Alligator (t)	6,7	Tetratop (t)	6,7
Allodia (t)	6,7	Wiesenschwingel	
Barcampo (t)	6,7	Baltas	6,7
Boccacio (t)	6,7	Cosmolit	6,7
Diwan (t)	6,7	Cosmopolitan	6,7
Garbor (t)	6,7	Liherold	6,7
Ozia (t)	6,7	Lipoche	6,7
Tribal (t)	6,7	Pardus	6,7
Trivos (t)	6,7	Pradel	6,7
Dt. Weidelgras spät		Preval	6,7
Albion (t)	6,7	Wiesenlieschgras	
Casero (t)	6,7	Aturo	6,7
Dressano (t)	6,7	Comer	6,7
Hurricane (t)	6,7	Lischka	6,7
Kentaur (t)	6,7	Phlewiola	6,7
Montova (t)	6,7	Polarking	6,7
Novello (t)	6,7	Rubato	6,7
Polim (t)	6,7	Summergraze	6,7
Sputnik	6,7	Knaulgras	
Valerio (t)	6,7	Aldebaran	6,7
Welsches Weidelgras		Barlegro	6,7
Barmultra II (t)	6,7	Diceros	6,7
Dolomit (t)	6,7	Lyra	6,7
Dorike (t)	6,7	Revolin	6,7
Gemini (t)	6,7	Treposno	6,7
Melquatro (t)	6,7	Rotklee	
Melsprinter (t)	6,7	Blizard (t)	6,7
Mervana (t)	6,7	Elanus (t)	6,7
Montoro (t)	6,7	Fregata (t)	6,7
Morunga (t)	6,7	Larus (t)	6,7
Nabucco (t)	6,7	Magellan (t) ¹⁾	6,7
Oryx	6,7	Taifun (t) ¹⁾	6,7
Zorro (t)	6,7	Tempus (t)	6,7
Einjähriges Weidelgras		Titus (t) ¹⁾	6,7
Bendix (t)	6,7	Tornado (t)	6,7
Jumper (t)	6,7	Luzerne	
Meljump (t)	6,7	Alpha	6,7
Ramiro	6,7	Catera	6,7
Vivaro (t)	6,7	Daphne	6,7
Volubyl	6,7	Fleetwood	6,7
Festulolium		Fusion	6,7
Achilles (t)	6,7	Planet	6,7
Fedoro (t)	6,7	Plato	6,7
Felopa (t)	6,7	Sanditi	6,7
Mahulena (h)	6,7	Verko	6,7
Paulita (t)	6,7		
Perseus (t)	6,7		

(t) = tetraploide / (h) = haploide Sorte

¹⁾ nicht geeignet in
Stängelbrennerbefallslagen

Glatthafer, Persischer Klee

Alle in der aktuellen „Beschreibenden Sortenliste Futtergräser, Eparsette, Klee, Luzerne“ aufgeführten Sorten



THÜRINGER QUALITÄTS-SAATMISCHUNGEN FÜR DEN ACKERFUTTERBAU

Einsömrriger und überjähriger Ackerfutterbau

Art	Saatmenge (kg/ha)					
	einsömrrig			überjährig		
	A2	1.1.	1.2. K	A1*	2.1.	2.2 K
Empfohlen für Anbaugbiet	6, 7	6, 7	7	6, 7	7	7
Einjähriges Weidelgras	15	40	5			
Welsches Weidelgras	30		5	30-40	20	6
Persischer Klee			10			
Rotklee					8	12
Mischung	45	40	20	30-40	28	18

* Aussaatstärke 30 kg/ha bei diploiden Sorten, bei tetraploiden je nach Anteil bis 40 kg/ha

Zwei- und mehrjähriger Ackerfutterbau

Art	Saatmenge (kg/ha)									
	3.1. K	3.2.	3.3.	3.4. K	3.5. K	3.6. K	3.7. K	3.8. K	3.9. K	3.10. K
Empfohlen für Anbaugbiet	7	7	7	7	6	6	6	6	6, 7	6, 7
Bastardweidelgras/Festulolium		16	20							
Deutsches Weidelgras		4		3						
Wiesenschwingel	9			10			6	6	5	6
Wiesenlieschgras	3			2				2	2	2
Knautgras					2	4				
Glatthafer						3	2			2
Rotklee	13	8	8	13					6	7
Luzerne					18	13	12	10	7	8
Mischung	25	28	28	28	20	20	20	18	20	25

Reinsaat

Empfohlen für Anbaugbiet	6	7
Reinsaat (12 kg/ha)	Luzerne	Rotklee

Gemenge mit Körnerleguminosen [empfohlen für KULAP, ökologische Vorrangfläche (ÖVF) und alle Anbaugbiete]

Art	Saatmenge (kg/ha)	Art	Saatmenge (kg/ha)	Art	Saatmenge (kg/ha)	Art	Saatmenge (kg/ha)
Ackerbohne	mind. 150	Wintererbse	mind. 40	Sommererbsen	mind. 80	Blaue Lupine	mind. 80
Getreide (auch mehrere)	max. 100	Wintergetreide (auch mehrere)	max. 100	Sommergetreide (auch mehrere)	max. 80	Getreide (auch mehrere)	max. 80
Wintertriticale		Winterweizen,		Hafer,		Sommergerste,	
Winterweizen bzw.		Wintertriticale,		Sommergerste		Hafer	
Hafer, Triticale		Winterroggen					

Mischungen mit der Bezeichnung „A“ werden in den Bundesländern Thüringen, Sachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz empfohlen. Die Mischungen 1.2 (QA 4), 3.1 (QA 5), 3.4 (QA 6), 3.6 (QA 7), 3.9 (QA 8) und 3.10 (QA 10) werden in Thüringen und Sachsen empfohlen. Die Empfehlung der anderen Mischungen gilt nur für Thüringen.

K = Empfehlung zur Eignung auf KULAP- bzw. ÖVF-Flächen

Herausgeber: Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum
Bearbeiter: Harald Hegner
 Jena, April 2020

Copyright: Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die des Nachdruckes von Auszügen und fotomechanische Wiedergabe sind dem Herausgeber vorbehalten.